

Nephrologie und Covidimpfung

Laut Impfempfehlung von 8.3.21 können alle drei Impfstoffe bei Immuns. verwendet werden.

Z.n. Nierentransplantation

Stabile NTX Patienten mit einer stabilen Standardtherapie können und sollen geimpft werden. Wir wissen, dass nicht alle auf die Impfung ansprechen werden, deswegen ist das Weiterführen von Covid Schutzmaßnahmen erforderlich.

Zuzuwarten ist bei Abstoßungstherapie mit Steroiden u/o Antikörpern. Werden nur Steroide verwendet kann nach Erreichen der Erhaltungsdosis geimpft werden, bei Antikörpergabe sollte 3 Monate zugewartet werden.

Autoimmunerkrankungen (SLE, Vaskulitis, GN etc)

Patienten mit einer stabilen Standardtherapie können und sollen geimpft werden. Wir wissen, dass nicht alle auf die Impfung ansprechen werden, deswegen ist das Weiterführen von Covid Schutzmaßnahmen erforderlich.

Bei Therapie eines Schubes mit Steroiden kann nach Erreichen der Erhaltungsdosis geimpft werden.

Bei Rituximab Therapie sollte 6 Monate gewartet werden. Hier ist ein mRNA Impfstoff empfehlenswert, wegen der kurzen Impfabstände.

Es sollte keine IS wegen der Impfung abgesetzt oder reduziert werden.